03. 1767 donnée par M. Hevin

67

observation d'un fetus difforme par Mr. Bajon chirurgien ordinaire des hopitaux du Roy A Cayenne

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Le 20 du mois d'avril de cette année le pere duberlan ancien jesuite de cette colonie, m'anvoya un enfant né d'une negresse, sans machoire inferieure, sans bouche, sans nez, et n'ayant qu'un oeil; cet enfant me parut etre aterme, tant par son volume que par la grandeur des parties qui le constituoient les cheveux etoient longs et extremement epais et couvroient meme tout le coronal jusqu'a l'arcade sourciliere, les os de la tete etoient tous separés les uns des autres, et la fontanelle au lieu de se trouver entre l'articulation de la partie superieure du coronal avec les parietaux, etoit ~~entre~~ au niveau de ces deux os avec l'occipital et entre le meme os et les parietaux, il y avoit un os surnumeraire qui augmentoit considerablement le volume de la tete

Le coronal n'avoit pas sa forme ordinaire, il etoit considerablement alongé dans ses parties laterales et son articulation avec le sphenoide etoit tres inferieure, d'autant plus que les temporaux paroissoient etre a la Base du cranne, et les conduits audit[ifs]

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 26 n° 7

externe de l'oreille à la partie superieure du
cou, presque tous les sujets de cet age ont
ordinairement le coronal partagé en deux portions
egalles par une suture qui s'etend depuis la
sagitalle jusqu'a la racine du nez; dans celuy
ci il n'y en paroit pas le moindre vestige, et cet
os paroit être fait d'une meme piece. l'oeil est
situé precisement a la place du nez, l'enfoncement
du coronal [illegible] servir a la formation de la
cavite orbitaire etoit a l'endroit de l'apophise nasale
le dessus de cet oeil etoit entouré d'un sourcil
fort etendu, et sembloit etre ses arcs tendue vers
la moitié de l'oeil, par un leger defaut
de quelque poil. les paupieres etoient fort grandes,
la superieure etoit echancrée en deux endroits diferens
ce qui la partageoit en trois portions presque egalles;
l'inferieure n'etoit partagée qu'en deux mais par
une echancrure infinement plus forte que celles de
la superieure. les deux paupieres etoient
jointes aux deux angles uniformement, je n'ai pu
observer à aucun de ses angles la caroncule lacrimalle
ny la glande de ce meme nom. quant au globe
de l'oeil il etoit au moins aussi grand que

celuy d'un enfant de 8 à 10 ans, La Cornée transparente paroissoit avoir plus d'étendue quelle n'a ordinairement La Cornée opaque paroissoit par La ~~ceux~~ moins grande, elle etoit atachée aux paupieres par Le moyen de La conjonctive comme a L'ordinaire

Le nez manquoit entierement, et a dire les os quarrés et les Cartilages, quant a L'ethmoïde et aux cornets inferieurs Je ne puis en rien dire d'autant plus qu'il m'auroit fallu Le dissequer pour pouvoir en juger. Les os de La pomette etoient a Leur place naturelle, de meme que les os maxilaires, mais qui etoient plus petits qu'a L'ordinaire, Les os terminoient inferieurement La face par un rebord assez mince, et auquel il ne paroissoit point de Gencive n'y de rebord alveolaire. La Machoire inferieure manquoit de meme que La Bouche et La Langue, La face etoit terminée inferieurement par une eminence des tegumens assez considerable, cet alongement de La peau paroissoit être celuy qui etoit destiné a recouvrir le nez, d'autant plus qu'il se Rencontre a sa place, au dessous de cette meme eminence, j'ai trouvé une

ouverture à introduire une legere Sonde, il Semble que cette ouverture auroit dû Communiquer avec La branche artere et l'oesophage, mais je n'ai pas decouvert cette Communication quoique j'aie donné toutes les Configuration qui m'ont paru necessaire pour aller aux Sondes et stilets dont je me suis Servi.

Ses oreilles etoient Situées de façon quelles paroissoient être en partie dans le cou, et le conduit auditif externe de l'oreille etoit tout afait hors des parties externes de cet organe et audessous du Lobe, mais je crois que cette Situation dependoit en partie de ce que la machoire inferieure manquoit et que les temporaux se trouvoient un peu plus du Coté de la Base du crane.

il n'y avoit plus rien de particulier dans les autres parties de cet enfant, si non que l'escrotum ne paroissoit presque pas, et qu'il n'y avoit point de testicule ; mais elles pouvoient être dans le bas ventre, et peut-être Seroient elles descendues avec le tems par les anneaux comme cela arrive assez Souvent